



# Per valutare l'importanza dei Vostri sintomi urinari rispondete alle seguenti domande

## PUNTEGGIO SINTOMATOLOGICO PROSTATICO INTERNAZIONALE (IPSS)

	Mai	Meno di 1 su 5	Meno di metà	Circa metà	Più di metà	Quasi sempre
1. Nell'ultimo mese, quante volte ha avuto sensazione di mancato svuotamento della vescica dopo la minzione?	0	1	2	3	4	5
2. Nell'ultimo mese, quante volte ha dovuto urinare nuovamente a meno di due ore dalla precedente minzione?	0	1	2	3	4	5
3. Nell'ultimo mese, quante volte si è interrotta e quindi ripresa la minzione?	0	1	2	3	4	5
4. Nell'ultimo mese, quante volte ha trovato difficoltà nel ritardare la minzione?	0	1	2	3	4	5
5. Nell'ultimo mese, quante volte ha avuto un getto urinario debole?	0	1	2	3	4	5
6. Nell'ultimo mese, quante volte ha dovuto comprimere e sforzarsi per iniziare la minzione?	0	1	2	3	4	5
	<i>Mai</i>	<i>1 volta</i>	<i>2 volte</i>	<i>3 volte</i>	<i>4 volte</i>	<i>5 volte</i>
7. Nell'ultimo mese, mediamente quante volte per notte si è alzato per urinare?	0	1	2	3	4	5

PUNTEGGIO TOTALE: .....

	Bene	Soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Così così	Relativamente male	Male	Molto male
Se dovesse trascorrere il resto della sua vita con la sua condizione urinaria, come si sentirebbe?	0	1	2	3	4	5	6